

Übersicht RSV-Prophylaxe

	Impfstoffe		Antikörper	
Produktname	Arexvy®	Abrysvo®	Synagis®	Beyfortus®
Wirkstoff	Respiratorischer Synzytial-Virus-Impfstoff (rekombinant, adjuvantiert)	Respiratorischer Synzytial-Virus-Impfstoff (rekombinant)	Palivizumab	Nirsevimab
Indikation	Der Impfstoff ist indiziert zur aktiven Immunisierung von Erwachsenen im Alter von 60 Jahren und älter zur Prävention von durch das Respiratorische Synzytial-Virus verursachten Erkrankungen der unteren Atemwege (<i>lower respiratory tract disease</i> , LRTD).	<ol style="list-style-type: none"> Zur aktiven Immunisierung von Personen ab einem Alter von 60 Jahren zur Prävention von durch RSV verursachten Erkrankungen der unteren Atemwege. Zum passiven Schutz von Säuglingen ab der Geburt bis zum Alter von 6 Monaten vor Erkrankungen der unteren Atemwege, die durch das Respiratorische Synzytial-Virus (RSV) verursacht werden, nach Immunisierung der Mütter während der Schwangerschaft. 	Das Arzneimittel ist indiziert zur Prävention von durch das Respiratorische Synzytial-Virus (RSV) hervorgerufenen schweren Erkrankungen der unteren Atemwege, die Krankenhausaufenthalte erforderlich machen, bei Kindern mit hohem Risiko für RSV-Erkrankungen: <ul style="list-style-type: none"> – Kinder, die in der 35. Schwangerschaftswoche oder früher geboren wurden und zu Beginn der RSV-Saison jünger als 6 Monate sind. – Kinder unter 2 Jahren, die innerhalb der letzten 6 Monate wegen bronchopulmonaler Dysplasie behandelt wurden. – Kinder unter 2 Jahren mit hämodynamisch signifikanten angeborenen Herzfehlern. 	Das Arzneimittel ist indiziert zur Prävention von Respiratorischen Synzytial-Virus(RSV)-Erkrankungen der unteren Atemwege bei Neugeborenen, Säuglingen und Kleinkindern während ihrer ersten RSV-Saison.
STIKO-Empfehlung/ G-BA-Beschluss	Für alle Personen ab 75 Jahren empfiehlt die STIKO eine einmalige Impfung möglichst im September/Anfang Oktober. Außerdem empfiehlt die STIKO Personen ab 60 Jahren mit schweren Formen bestimmter Grunderkrankungen (z. B. chronische Erkrankungen der Atmungsorgane, des Herz-Kreislauf-Systems und der Nieren) und angeborener oder erworbener Immundefizienz eine einmalige Impfung.	Für alle Personen ab 75 Jahren empfiehlt die STIKO eine einmalige Impfung möglichst im September/Anfang Oktober. Außerdem empfiehlt die STIKO Personen ab 60 Jahren mit schweren Formen bestimmter Grunderkrankungen (z. B. chronische Erkrankungen der Atmungsorgane, des Herz-Kreislauf-Systems und der Nieren) und angeborener oder erworbener Immundefizienz eine einmalige Impfung.	Nach Anlage IV Arzneimittel-Richtlinie (AM-RL; Therapiehinweise) nur wirtschaftlich für Kinder mit hohem Risiko für schwere Krankheitsverläufe, z. B. Kinder mit hämodynamischen Herzfehlern oder Trisomie 21.	Die STIKO empfiehlt für alle Neugeborenen und Säuglinge eine einmalige Prophylaxe mit dem Antikörper Nirsevimab in ihrer ersten erlebten RSV-Saison.
Erstattungsfähigkeit	Ja, der STIKO-Beschluss ist Ende September in Kraft getreten.	Ja, der STIKO-Beschluss ist Ende September in Kraft getreten.	Ja.	Ja, der STIKO-Beschluss ist Mitte September in Kraft getreten.