

## Übersicht RSV-Prophylaxe

	Impfstoffe		Antikörper	
Produktname	Arexvy®	Abrysvo®	Synagis®	Beyfortus®
<b>Wirkstoff</b>	Respiratorischer Synzytial-Virus-Impfstoff (rekombinant, adjuvantiert)	Respiratorischer Synzytial-Virus-Impfstoff (rekombinant)	Palivizumab	Nirsevimab
<b>Indikation</b>	Der Impfstoff ist indiziert zur aktiven Immunisierung von Erwachsenen im Alter von 60 Jahren und älter zur Prävention von durch das Respiratorische Synzytial-Virus verursachten Erkrankungen der unteren Atemwege ( <i>lower respiratory tract disease, LRTD</i> ).	<ol style="list-style-type: none"> <li>Zur aktiven Immunisierung von Personen ab einem Alter von 60 Jahren zur Prävention von durch RSV verursachten Erkrankungen der unteren Atemwege.</li> <li>Zum passiven Schutz von Säuglingen ab der Geburt bis zum Alter von 6 Monaten vor Erkrankungen der unteren Atemwege, die durch das Respiratorische Synzytial-Virus (RSV) verursacht werden, nach Immunisierung der Mütter während der Schwangerschaft.</li> </ol>	Das Arzneimittel ist indiziert zur Prävention von durch das Respiratorische Synzytial-Virus (RSV) hervorgerufenen schweren Erkrankungen der unteren Atemwege, die Krankenhausaufenthalte erforderlich machen, bei Kindern mit hohem Risiko für RSV-Erkrankungen: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Kinder, die in der 35. Schwangerschaftswoche oder früher geboren wurden und zu Beginn der RSV-Saison jünger als 6 Monate sind.</li> <li>– Kinder unter 2 Jahren, die innerhalb der letzten 6 Monate wegen bronchopulmonaler Dysplasie behandelt wurden.</li> <li>– Kinder unter 2 Jahren mit hämodynamisch signifikanten angeborenen Herzfehlern.</li> </ul>	Das Arzneimittel ist indiziert zur Prävention von Respiratorischen Synzytial-Virus(RSV)-Erkrankungen der unteren Atemwege bei Neugeborenen, Säuglingen und Kleinkindern während ihrer ersten RSV-Saison.
<b>Dosierung</b>	Das Arzneimittel wird als Einzeldosis verabreicht. Die Notwendigkeit einer Auffrischimpfung mit einer weiteren Dosis ist nicht erwiesen.	<b>Personen ab einem Alter von 60 Jahren:</b> Es wird eine Einzeldosis verabreicht. <b>Schwangere:</b> Es wird eine Einzeldosis zwischen den Schwangerschaftswochen 24 und 36 verabreicht.	Die empfohlene Dosierung beträgt 15 mg Palivizumab/kg Körpergewicht. Diese ist einmal im Monat, während des Zeitraums eines erhöhten RSV-Infektionsrisikos in der Bevölkerung, zu verabreichen. Wenn möglich, sollte die erste Dosis vor Beginn der RSV-Saison verabreicht werden, die nachfolgenden Dosen monatlich während der RSV-Saison. Aufgrund der Datenlage sollten maximal 5 Dosen verabreicht werden.	Die empfohlene Dosis ist eine 50-mg-Einzeldosis, intramuskulär angewendet, bei Säuglingen/Kleinkindern mit einem Körpergewicht < 5 kg sowie eine 100-mg-Einzeldosis, intramuskulär angewendet, bei Säuglingen/Kleinkindern mit einem Körpergewicht von ≥ 5 kg.
<b>STIKO-Empfehlung/G-BA-Beschluss</b>	Bis jetzt noch keine Empfehlung der STIKO.	Bis jetzt noch keine Empfehlung der STIKO.	Nach Anlage IV Arzneimittel-Richtlinie (AM-RL; Therapiehinweise) nur wirtschaftlich für Kinder mit hohem Risiko für schwere Krankheitsverläufe, z. B. Kinder mit hämodynamischen Herzfehlern oder Trisomie 21.	Nach Anlage IV AM-RL (Therapiehinweise) nur wirtschaftlich für Kinder mit hohem Risiko für schwere Krankheitsverläufe, z. B. Kinder mit hämodynamischen Herzfehlern oder Trisomie 21.
<b>Erstattungsfähigkeit</b>	Zurzeit nicht erstattungsfähig.	Zurzeit nicht erstattungsfähig.	Ja.	Ja.